PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT

PEROXID DE HIDROGEN-ELADUM 30 mg/ml soluţie cutanată
Peroxid de hidrogen

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Peroxid de hidrogen-ElaDum şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum
3. Cum să luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen-ElaDum
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Peroxid de hidrogen-ElaDum şi pentru ce se utilizează

Peroxidul de hidrogen este o substanță din grupul antisepticelor cu acțiune oxidantă. Sub influenţa unor enzime se descompune în apă şi oxigen atomar cu putere oxidativă mare, care acționează negativ asupra dezvoltării microbilor. La pătrunderea soluţiei în rană oxigenul degajat are şi efect mecanic, înlăturând puroiul şi corpii străini din rană în urma formării unei spume abundente. Această spumă contribuie la formarea cheagurilor de sânge şi oprirea sangerărilor mici.

Peroxid de hidrogen–ElaDumse utilizează pentruprelucrarea rănilor superficiale, oprirea sângerărilor din vasele mici de sânge (capilare)în rănile superficiale, în sangerări nazale; gargarisme în stomatite, tonzilite;boli ginecologice.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum

Nu luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la peroxid de hidrogen sau la alte componente ale medicamentului enumerate la pct. 6.

Atenţionări şi precauţii
A se evita contactul preparatului cu mucoasa ochiului.
Nu se utilizează pentru spălarea cavităţilor.
Lumina şi căldura reduc activitatea preparatului.

Informații importante despre unii excipienți
Conţine benzoat de sodiu. Uşor iritant al pielii, ochilor şi mucoaselor.

Peroxid de hidrogen-ElaDumîmpreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.
Efectul tratamentului poate fi modificat dacă peroxidul de hidrogen este utilizat în acelaşi timp cu alte medicamente.

Acţiunea antiseptică scade în mediul alcalin. Sărurile metalelor, radicalii compuşilor unor oxidanţi reduc acţiunea peroxidului de hidrogen.

Peroxid de hidrogen-ElaDumîmpreună cu alimente şi băuturi
Peroxid de hidrogen-ElaDumse utilizează cutanat.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Preparatul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. Cum să luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum
Utilizaţi întotdeauna Peroxid de hidrogen-ElaDumexact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Mod de utilizare
Utilizare cutanată.
Porţiunile afectate ale pielii se prelucrează cu un tampon de vată sau tifon, îmbibat în soluţie de 10-30 mg/ml.
Pentru prelucrarea mucoaselor și pentru gargarisme se utilizează soluţia 2,5 mg/ml.

Dacă luaţi mai mult Peroxid de hidrogen-ElaDumdecât trebuie
Nu sunt relatate cazuri de supradozare la utilizare cutanată.

Dacă uitaţi să luaţi Peroxid de hidrogen-ElaDum
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)
Senzaţie de usturime în timpul prelucrării rănii.

Reacţii adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori)
Reacţii alergice.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse posibile nemenţionate în acest prospect. Puteţi raporta, de asemenea, reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, disponibil pe

site-ul AMDM la următoarea adresă web: www.amed.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Prin raportarea efectelor adverse veţi ajuta la furnizarea mai multor informaţii cu privire la siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen-ElaDum
Nu lăsați acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizaţi Peroxid de hidrogen–ElaDumdupă data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp:.”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Peroxid de hidrogen-ElaDum
Substanţaactivăeste peroxidul de hidrogen.
40 ml soluţie cutanată conţin 4,00** g peroxid de hidrogen (soluţie 30-40% sau soluție 40-60%*).

100 ml soluţie cutanată conţin 10,00** g peroxid de hidrogen (soluţie 30-40% sau soluție 40-60%*).

1000 ml soluţie cutanată conţin 100,00** g peroxid de hidrogen (soluţie 30-40% sau soluție 40-60%*).

* se face recalcul în dependență de concentrația materiei prime
** calcul efectuat cu concentratia materiei prime "Peroxid de hidrogen 30%".

Celelalte componente sunt: benzoat de sodiu, apă purificată.

Cum arată Peroxid de hidrogen-ElaDum
Soluție limpede, incoloră, aproape fără miros.
Câte 40 ml, 100 ml sau 1000 ml în flacon din polietilenă de culoare brună închis cu căpăcel din polietilenă.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul
ElaDumPharma SRL
MD-3715, Republica Moldova, r-nul Strășeni,
s. Cojușna, str. Podgorenilor, 2/c
tel: + 237 42 927

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amed.md/