

Aviz sanitar nr. 2888 din 06.11.2017

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dimexid-ElaDum

soluție cutanată

Dimethylsulfoxidum

1 flacon conține: dimetilsulfoxid 50 ml sau 100 ml.

Dimetilsulfoxidul manifestă acțiune antiinflamatoare, analgezică, antiseptică și fibrinolică. Are capacitatea de a pătrunde prin membranele biologice, inclusiv prin piele, facilitând absorbția prin pielea intactă și mucoase a medicamentelor. Există date că preparatul este capabil să restabilească activitatea antimicrobiană a antibioticelor față de tulpinile microorganismelor rezistente sau moderat sensibile.

Domeniu de utilizare:

Dimexid se indică în tratamentul afecțiunilor inflamatoare ale aparatului locomotor, contuzii, infiltrate traumatiche, edeme inflamatoare, plăgi purulente, abcese, osteomielite acute și cronice, în tratamentul eritemului nodos, streptodermiei, etc.

Dimexid poate fi utilizat în asociere cu preparatele antiinflamatoare nesteroidiene în terapia complexă a osteoartrozei deformante și artritei reumatoide, în asociere cu antibacteriene cu acțiune locală – în tratamentul sclerodermiei, acneei, erizipelului, furunculozei, foliculitelor și altor afecțiuni cutanate; în asociere cu heparina – în tromboflebite.

Mod de utilizare:

Dimexid se administrează extern sub formă de aplicări și irigații, preponderent sub formă de soluții apoase (30-50%) aplicate pe meșe de tifon, comprese. Compresele se aplică pe porțiunile lezate și pe suprafețele sănătoase adiacente.

Meșele de tifon umezite cu soluție de dimetilsulfoxid se aplică pe porțiunile lezate timp de 20-30 minute o dată pe zi. Deasupra meșei de tifon se aplică o peliculă de polietilenă și țesătură de bumbac sau in. Durata utilizării – 10-15 zile.

În tratamentul erizipelului și ulcerelor trofice se utilizează soluția apoasă de 30-50% câte 50-100 ml de 2-3 ori pe zi.

În eczemă, streptodermii difuze se recomandă comprese cu soluție de 40-90% dimetilsulfoxid.

În maladii purulente cutanate se utilizează soluția 40%. Pentru anestezie locală se recomandă soluția de 25-50% pentru comprese câte 100-150 ml de 2-3 ori pe zi. În tratamentul arsurilor profunde se utilizează pansamente cu soluție 20-30% dimetilsulfoxid (la necesitate – până la 500 ml).

Efecte nedorite:

Dimexid, de obicei, este bine tolerat, dar uneori poate apărea înroșirea pielii, prurit, amețeli, insomnie, adinamie, dermatite, diaree. În unele cazuri se observă greață, bronhospasm. În caz de apariție a efectelor nedorite, consultați medicul.

Restricții în utilizare:

- Alergie (hipersensibilitate) la preparat,
- insuficiență cardio-vasculară severă,
- ateroscleroză,
- angină pectorală,
- ictus cerebral,
- comă,
- dereglări ale funcției rinichilor și ficatului,
- cataractă,

- glaucom,
- sarcina,
- perioada de alăptare.

Atenționări:

Cu precauție se utilizează la pacienții vârstnici (cu vârsta peste 65 ani), la copii până la 7 ani.

Pentru a evita posibila alergie individuală la preparat se recomandă efectuarea testului de sensibilitate: se aplică pe piele un tampon de vată umezit în soluție. La apariția înroșirii puternice a pielii și pruritului utilizarea preparatului este contraindicată.

La temperatura sub 18°C este posibilă cristalizarea dimetilsulfoxidului. Aceasta nu influențează calitatea și proprietățile preparatului.

Topirea cristalelor poate fi efectuată prin încălzirea ușoară a flaconului cu preparat pe baia de apă (temperatura apei circa 60 °C).

Se va evita contactul preparatului cu mucoasa ochiului.

A se consulta medicul înainte de utilizare.

Condiții de păstrare:

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura 15-25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Fabricat:

SRL ElaDumPharma

Republica Moldova, r-nul Strășeni,

s. Cojușna, str. Centenarului 2/C

tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408

Câte 50 ml sau 100 ml în flacon.

Seria: vezi pe ambalaj.

Exp.: vezi pe ambalaj.