

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Iodinol-ElaDum soluție cutanată

Iodum* *Kalii iodidum

100 ml conține:

iod - 0,1 g, iodură de potasiu – 0,3 g, alcool polivinilic – 0.9g, apa până la 100 ml.

Iodinolul (iodpolivinilalcool, alcool iodpolivinilic) reprezintă un produs de adăugare a iodului molecular (cristalin) la alcoolul polivinilic.

Posedă proprietăți antiseptice și manifestă efect bactericid, atât asupra florei gram-pozitive, cât și gram-negative, fungi și levuri patogene, mai activ – față de flora streptococică și *E. coli*. O floră mai rezistentă sunt stafilococii, dar la utilizarea îndelungată a iodinolului în 80% cazuri este eliminat și acest agent patogen. *Pseudomonas aeruginosa* este rezistentă la aplicarea locală a iodinolului. Iodinolul este puțin toxic.

Domeniu de utilizare

Inflamația cronică a amigdalelor, inflamația urechii cu eliminări purulente, tratamentul ozenei – atrofie a mucoasei nasului, cu eliminări purulente și cruste, răni purulente, inclusiv după intervenții chirurgicale, ulcere trofice și varicoase, arsuri termice și chimice.

Mod de utilizare

În inflamația cronică a amigdalelor se efectuează irigarea lacunelor amigdalelor și spațiului supratonzilar. În total - 4-5 irigări cu interval de 2-3 zile. Doza pentru o irigare constituie 50 ml.

În inflamația urechii cu eliminări purulente: instilarea zilnică a 5-8 picături de iodinol. Durata curei de tratament – 2-4 săptămâni.

În tratamentul ozenei, după înmuierea prealabilă și înlăturarea crustelor, se efectuează pulverizarea cavității nazale și nazofaringelui cu iodinol de 2-3 ori pe săptămână în decurs de 2-3 luni.

În ulcere trofice și varicoase membrul afectat, inclusiv suprafața ulcerooasă, se spală preferabil cu perie cu apă caldă și săpun. Pe pielea din jurul ulcerului se aplică unguent de zinc.

Pe suprafața ulcerului se aplică un pansament din 3 straturi de tifon, îmbibat cu iodinol. Aplicarea pansamentelor se efectuează de 1-2 ori pe zi, însă tifonul, care este în contact cu suprafața ulceratei, nu se înlătură, ci se îmbibă din nou cu iodinol. Peste 4-7 zile persoanei i se efectuează o baie generală sau locală, după care prelucrarea indicată continuă.

Pe suprafața rănilor purulente și arsurilor infectate se aplică un pansament flasc de tifon îmbibat cu preparat, care se schimbă periodic, pe măsura necesității. În prezența plăgilor cavitate se efectuează lavajul cavităților cu iodinol și se introduc tampoane, îmbibate cu preparat.

În arsuri termice și chimice superficiale recente după prelucrarea primară se aplică un bandaj cu iodinol, stratul intern al căruia se îmbibă cu o porție nouă de preparat pe măsura necesității.

Efecte nedorite

La pacienții cu alergii la iod se pot manifesta fenomene de iodism sub formă de erupții pe piele sau inflamație a mucoasei nasului, care nu necesită luarea unor măsuri speciale sau oprirea tratamentului.

Restricții în utilizare

Alergie la preparatele iodului.

Atenționări

Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Condiții de păstrare

A se păstra la loc răcoros, ferit de lumină.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Cutie cu flacon conținând 100 ml soluție.

Seria: a se vedea pe ambalaj.

Exp.: a se vedea pe ambalaj.