

Aviz sanitar nr. 274 din 26.06.2018
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ULEI DE CĂȚINĂ - ElaDum
ulei
Oleum Hippophae rhamnoides

Un flacon conține: ulei de cătină albă - 50 ml.

Uleiul din fructe de cătină reduce acțiunea de lezare a substanțelor toxice, compușilor peroxidici și altor factori agresivi, protejează membranele celulare și structurile intracelulare datorită prezenței în compoziția sa a substanțelor biologice active naturale. Medicamentul stimulează cicatrizarea în caz de lezare a pielii și mucoaselor, manifestă acțiune antibacteriană (bacteriostatică), manifestă acțiune mucilaginoasă și de stimulare a eliminării bilei. Uleiul de cătină acționează benefic asupra proceselor de nutriție celulară, activității organelor digestive.

Domeniu de utilizare

Cutanat se utilizează în tratamentul arsurilor, escarelor, leziunilor prin iradiere ale pielii și mucoaselor.

Oral – pentru tratamentul complex al bolilor esofagiene, ulcerului gastric și duodenal.

Sub formă de inhalatii – în tratamentul bolilor inflamatoare ale căilor respiratorii superioare (nasofaringelui, coardelor vocale, traheii, bronhiilor).

Topic – în boli ginecologice (colpitate, endocervicite, eroziuni ale colului uterin), în proctologie (proctite eroziv-ulceroase, atrofile, fisuri anale, hemoroizi), pentru tratamentul patologiei cronice și în perioada de convalescență după patologia acută a amigdalelor (tonzilită, amigdalită), sinusurilor maxilare (sinuzite), sclerelor (keratite), conjunctivei oculare (conjunctivite), inflamațiile marginilor pleoapelor (blefarite), ulcerelor corneene.

Mod de utilizare

Preparatul se utilizează cutanat, oral sau topic, inclusiv sub formă de inhalatii.

În bolile de piele preparatul se utilizează peste o zi sub formă de pansamente uleioase, în prealabil curățind rana de mase necrotice, până la apariția zonelor de regenerare tisulară.

În boli ginecologice – colpitate, endocervicite – cu tampoane de vată, îmbibate cu ulei de cătină, se prelucrează pereții vaginului, porțiunea vaginală și canalul colului uterin (după curățirea lor prealabilă); în eroziunea colului uterin se aplică tampoane de vată, îmbibate cu ulei de cătină (tamponul se aplică pe locul eroziunii, tampoanele se schimbă zilnic). Durata tratamentului colpitatei – 10-15 proceduri, endocervicitei și eroziunii colului uterin – 8-12 proceduri. La necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4-6 săptămâni.

În afecțiuni proctologice – fisuri anale, hemoroizi – cu tampoane de vată, îmbibate cu ulei de cătină, se prelucrează anusul și nodulii hemoroidali; în afecțiunile rectului uleiul se introduce în lumenul lui cu ajutorul microclismelor (în prealabil efectuând o clismă evacuatoare). Cura de tratament constituie – 10-12 proceduri. La necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4-6 săptămâni.

În bolile esofagului, în ulcer stomacal și duodenal uleiul de cătină se utilizează oral, câte 1 linguriță de ceai de 2-3 ori pe zi. Durata media a tratamentului constituie 3-4 săptămâni. La necesitate cura poate fi repetată peste 4-6 săptămâni.

În bolile organelor ORL – tonzilită cronică, perioada de convalescență după amigdalită, faringită cronică – cu tampoane de vată, îmbibate cu uleiul de cătină se prelucrează amigdalele, faringele; în sinuzita cronică meșele îmbibate cu ulei se introduc în căile nazale externe (în prealabil

curățându-le de mucus). Cura de tratament constituie 8-10 proceduri. La necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4-6 săptămâni.

În bolile căilor respiratorii superioare uleiul de cătină se utilizează sub formă de inhalații, în condiții de instituții medicale.

În bolile oculare uleiul de cătină se utilizează conform indicației și sub supravegherea medicului.

Efecte nedorite

Este posibilă hipersensibilitate individuală la preparat – reacții alergice, prurit, roșeață, edem al pielii, erupții pe piele, senzație de arsură (la utilizare cutanată).

Gust amar în gură, diaree (la utilizare orală).

La utilizare prin inhalație sunt posibile tulburări respiratorii din cauza spasmului bronhiilor, salivatie sporită.

Restricții în utilizare:

Alergie la preparat. La utilizare orală uleiul de cătină este contraindicat în boli inflamatorii acute ale vezicii biliare, ficatului, pancreasului, în caz de pietre la vezica biliară.

Atenționări

Preparatul se va utiliza cu precauție la persoanele predispuse la reacții alergice.

La copii preparatul se utilizează doar după evaluarea de către medic a raportului beneficiu/risc.

Utilizarea în sarcină și perioada de lactație este posibilă la indicația medicului, doar în situațiile când beneficiile scontate pentru mamă justifică riscul potențial pentru făt sau sugar.

Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

A se agita înainte de utilizare.

Condiții de păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Fabricat:

SRL ElaDum Pharma

Republica Moldova, r-nul Strășeni,

s. Cojușna, str. Centenarului 2/C

tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408

Cutie cu flacon a câte 50 ml.

Seria: a se vedea pe ambalaj.

Exp.: a se vedea pe ambalaj.